

Załącznik do decyzji MRiRW nr R -277/2018d z dnia 20.06.2018 r.
zmieniającej zezwolenia MRiRW nr R-57/2015 z dnia 19.03.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:

Sharda Cropchem Ltd., Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West) Mumbai – 400 050 ,
Republika Indii, tel. +91-(22) - 6678 2800, fax: +91-(22) - 6678 2828 / 6678 2808, email:
eu.sales@shardaintl.com

**Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:**

Sharda Poland sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: +48 17 240 13 07,
e-mail: eu.sales@shardaintl.com

**Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:**

Agrecol Sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, Mesznary 2, tel./fax: +48 627 832 000; 627 844 445,
www.agrecol.pl, e-mail: agrecol@agrecol.pl

Shardif 250 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

difenokonazol (substancja z grupy triazoli) - **250 g/l** (25,97 %)

Inne substancje nie będące substancją czynną:

Solwent nafta, węglowodory ciężkie aromatyczne

Zezwolenie MRiRW nr R - 8/2015wu z dnia 25.03.2015 r.

Ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R- 277/2018d z dnia 20.06.2018 r.



Niebezpieczeństwo

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z

Etykieta środka ochrony roślin Shardif 250 EC,

OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P331 - NIE wywoływać wymiotów.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P403 + P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P405 - Przechowywać pod zamknięciem.

OPIS DZIAŁANIA

Shardif 250 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym (systemicznym) do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni, gruszy, malin, jeżyn, pietruszki, marchwi, buraka pastewnego i roślin ozdobnych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych, ciągnikowych, wózkowych, taczkowych, plecakowych opryskiwaczy sadowniczych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Jabłoń

Parch jabłoni

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm do fazy gdy owoc osiąga 90% typowej wielkości (BBCH 71-79), do 21dni przed zbiorem.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 10-14 dni.

Zalecana ilość wody: 300-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Ilość cieczy dostosować do wielkości drzew i ich fazy rozwojowej.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Grusza

Parch gruszy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy białego pąka kwiatowego do końca fazy, gdy owoce osiągną połowę typowej wielkości (BBCH 57-75).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Malina, jeżyna

Rdza malin, zamieranie pędów malin, rdza jeżyn, zamieranie pędów jeżyn

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od początku kwitnienia (BBCH 60-79). Po wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych lub zapobiegawczo.

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Marchew, pietruszka korzeniowa

Mączniak prawdziwy, alternarioza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od momentu osiągnięcia przez korzeń średnicy powyżej 0.5 cm do pełnej wielkości (BBCH 42-49). Zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 100-500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Burak pastewny

Chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od końca fazy zakrywania międzyrzędzi do momentu, gdy korzeń osiągnie dojrzałość technologiczną (BBCH 39-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-28 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Róża uprawiana w gruncie

Mączniak prawdziwy, czarna plamistość

Maksymalne/zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych lub zapobiegawczo.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-14 dni.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Aster, floks, nagietek, gerbera, lyszczec, cyneraria, begonia uprawiane pod osłonami, w szklarniach

Mączniak prawdziwy

Maksymalne/zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych lub zapobiegawczo.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Goździk, cynia, lewkonia, aster uprawiane w gruncie

Alternarioza

Maksymalne/zalecane stężenie: 0,025% (25 ml środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych lub zapobiegawczo.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rośliny ozdobne w donicach

Plamistość liści, antraknoza

Maksymalne/zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody).

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych lub zapobiegawczo.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12°C.
2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.
3. Podczas stosowania nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące roślin uprawne.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wleciu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

- po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza — pokaż opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie od zbiorników i cieków wodnych strefy ochronnej o szerokości:

- W uprawie jabłoni:
 - 12 m;
- W uprawie gruszy (wczesne zastosowania środka):
 - 25 m lub
 - 20 m w przypadku zastosowania technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 % lub
 - 15 m w przypadku zastosowania technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75 % lub
 - 5 m w przypadku zastosowania technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90 %;
- W uprawie gruszy (późne zastosowania środka):
 - 15 m lub
 - 10 m w przypadku zastosowania technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 % lub
 - 0 m w przypadku zastosowania technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75 %;
- W uprawie maliny i jeżyny:
 - 30 m lub
 - 10 m w przypadku zastosowania technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75 % lub
 - 5 m w przypadku zastosowania technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%;
- W uprawie marchwi, pietruszki, buraka pastewnego i roślin ozdobnych:
 - 5 m.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie od terenów nieużytkowanych rolniczo strefy ochronnej o szerokości:

- 3 m w przypadku uprawy jabłoni, gruszy, maliny, jeżyny,

- 1 m w przypadku uprawy marchwi, pietruszki, buraka pastewnego i roślin ozdobnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Jabłoń – 21 dni.

Jeżyna, malina, marchew, pietruszka - 14 dni.

Grusza, burak pastewny – 28 dni.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w dobrze wentylowanych miejscach, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze nie przekraczającej zakresu 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. unikać wdychania rozpylonej cieczy.

W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub z lekarzem.

Nie wywoływać wymiotów.

W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -