

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 499/2024d z dnia 09.05.2024 r.  
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 217/2019 z dnia 06.12.2019 r.

**Posiadacz zezwolenia:**

Sharda Cropchem Limited z siedzibą 2nd Floor, Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai – 400 056, Indie, Tel. + 91 22 6678 2800, Fax : + 91 22 6678 2828 / + 91 22 6678 2808, email: regn@shardaintl.com

**Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin: (...)**

## ŚLIMATOX 5 GB

**Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych**

Zawartość substancji czynnej:  
metaldehyd (związek z grupy aldehydów) – 5 % (50 g/kg).

Zezwolenie MRiRW nr R - 217/2019 z dnia 06.12.2019 r.  
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 499/2024d z dnia 09.05.2024 r.

**Środek ochrony roślin w przypadku spożycia może być śmiertelny dla psów i innych zwierząt domowych oraz gospodarskich. Zwierzęta domowe oraz gospodarskie należy utrzymywać poza obszarami poddanymi działaniu środka ochrony roślin.  
W przypadku podejrzenia spożycia: skontaktować się natychmiast z lekarzem weterynarii.**



**Uwaga**

- H361f            Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.  
EUH401            W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.  
P262              Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.  
P280              Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.  
P308+P313        W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.  
Nie wykładać w kupkach.

**OPIS DZIAŁANIA**

MOLUSKOCYD w formie przynęty granulowanej, przeznaczonym do zwalczania ślimaków nagich. Środek przeznaczony do stosowania ręcznie lub przy użyciu mechanicznych aplikatorów do granulowanych preparatów.

**STOSOWANIE ŚRODKA**

**Zboża**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Stosować po siewie do końca fazy krzewienia (BBCH 29).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

#### **Rzepak ozimy, rzepak jary**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Stosować po siewie do końca fazy krzewienia (BBCH29).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

#### **Kukurydza**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Stosować po siewie do fazy 5 liści (BBCH15).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

#### **Salata, rukieta siewna (rukola)**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Stosować od sadzenia do fazy, gdy rozeta jest całkowicie rozwinięta lub główny pęd osiągnął wielkość typową dla odmiany (BBCH39).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

### **STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH**

*Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik*

#### **Len oleisty uprawiany na nasiona**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do fazy 7 liścia (BBCH 17).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

#### **Mak uprawiany na nasiona**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do fazy 7 liścia (BBCH 17).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

#### **Lnicznik siewny (Inianka siewna)**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do fazy 7 liścia (BBCH 17).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

#### **Słonecznik uprawiany na nasiona**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do fazy 7 liścia (BBCH 17).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

#### **Gorzycza biała, gorzycza sarepska**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie do końca formowania pędów bocznych, gdy widocznych jest 9 lub więcej pędów bocznych (BBCH 29).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

#### **Soja**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie do fazy, gdy widocznych jest 9 lub więcej pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 29).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

#### **Dynia uprawiana na nasiona**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.  
Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do fazy 7 liścia na pędzie głównym (BBCH 17).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

UWAGA:

**Miaższu dyni nie stosować do celów spożywczych i paszowych**

#### **Winorośl**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.  
Termin stosowania: Środek stosować od posadzenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

#### **Grusza, pigwa pospolita, nieszpulka zwyczajna**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.  
Termin stosowania: Środek stosować po posadzeniu do końca fazy 9 lub więcej widocznych pędów (BBCH 29).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2  
Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

#### **Seler korzeniowy**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do końca fazy 5-tego liścia ( $\leq$  BBCH 15).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

### **Chrzan pospolity**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do końca fazy 5-tego liścia ( $\leq$  BBCH 15).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

### **Brukiew jadalna**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do końca fazy 5-tego liścia ( $\leq$  BBCH 15).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

### **Rzepa biała, rzepa czarna, rzepa pastewna**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do końca fazy 5-tego liścia ( $\leq$  BBCH 15).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

### **Burak pastewny, burak ćwikłowy**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do końca fazy 5-tego liścia ( $\leq$  BBCH 15).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

### **Rośliny ozdobne**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI OKRESY KARENCCI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA**

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

1. Środek stosować po zauważeniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki.
2. Środek najlepiej stosować przy łagodnej, wilgotnej pogodzie, gdy ślimaki są najbardziej aktywne. W przypadku dużego nasilenia występowania ślimaków nagich może być konieczne powtórzenie zabiegu.
3. Nie stosować podczas silnych opadów deszczu, który może zmniejszyć trwałość granul.

4. Późne zastosowanie w uprawach roślin o rozłożystych liściach może spowodować pozostanie granul na liściach. Należy zachować ostrożność podczas stosowania w uprawach roślin bezpośrednio przeznaczonych do spożycia.

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH**

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę twarzy oraz odzież roboczą w trakcie wykonywania zabiegu oraz podczas zbiorów roślin.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Zwierzęta domowe oraz gospodarskie należy utrzymywać poza obszarami poddanymi działaniu środka ochrony roślin.

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO**

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Zebrać rozsypany przypadkowo produkt.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

### **WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA**

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w chłodnym miejscu.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

### **PIERWSZA POMOC**

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 2 lata

Data produkcji – .....

Zawartość netto – .....

Nr partii – .....